

# Stadt Langenau -Staudenmischungen-

## Blütenwucht



**Standort:** trockenheitsverträglich **Licht:** sonnig bis halbschattig **Farbe:** gelb, blau **Anwendungsgebiete:** Freiflächen und Gehölzränder  
**Pflege:** maschinelle Mahd im Spätwinter, Buddleja wird alle 2 bis 4 Jahre im Frühjahr auf Zapfen zurückgeschnitten

Name (botanisch - deutsch) (empfohlener Mengenanteil)	Stück/100m <sup>2</sup>	Hinweise (W: Winterwirkung d. Strukturen/Texturen od. wintergr. Belaubung)	Alternativart/-sorte
<b>1. Gerüstbildner</b>			
Buddleja davidii var. nanhoensis 'Nanho Blue' Kleinblättriger Sommerflieder	8	mit 2-3 m etwas kleiner als Sorten der var. davidii. Muss nicht jährlich zurückgeschnitten werden	Buddleja davidii var. nanhoensis 'Nanho Purple'
<b>2. Begleitstauden</b>			
Aster trinervius subsp. ageratoides 'Asran' Ageratum-Aster	70	durch Ausläufer stark ausbreitender Spätsommerblüher, an einigen Jahren die dominante Art der Mischung A. trinervius subsp. microcephalus 'Ashv	
<b>3. Füllpflanzen</b>			
Penstemon digitalis - Fingerhut-Bartfaden	100	weiße Blütenglöckchen, im Herbst rot überhauchtes Laub Digitalis grandiflora	
<b>4. Bodendecker</b>			
Carex caryophyllea 'The Beatles' Frühlings-Segge	100	frischgrüne Blattschöpfe, breiten sich langsam rasig aus	50 Carex sylvatica
Carex umbrosa - Schatten-Segge	200	niedriges immergrünes Horstgras	Carex montana
Primula veris - Echte Schlüsselblume	100	kalkliebende, trockenheitsverträgliche Rosettenstaude	Primula vulgaris subsp. vulgaris